决定花生籽粒油酸与亚油酸含量的关键酶 — Δ^{12} -油酸脱氢酶

张小茜^{1,2}, 单雷¹, 毕玉平^{1,2,*}, 李长生¹

(1. 山东省农业科学院高新技术研究中心, 山东省作物与畜禽品种改良生物技术重点实验室, 山东 济南 250100;
2. 济南铁道职业技术学院, 山东 济南 250013)

摘要: 本文介绍了高油酸花生研究的重要性与 Δ^{12} -油酸脱氢酶(FAD)的基本特性、结构特性、基因分类, 以及其促成高油酸花生的分子基础及其生物学特性。

关键词: 高油酸; Δ^{12} -FAD; 单不饱和脂肪酸; 多不饱和脂肪酸

Key Enzyme Determining Oleic and Linoleic Acid Content in Peanut Oilseeds— Δ^{12} -Oleic Acid Desaturase

ZHANG Xiao-qian^{1,2}, SHAN Lei¹, BI Yu-ping^{1,2,*}, LI Chang-sheng¹

(1. High-tech Research Center, Shandong Academy of Agricultural Science, Key Laboratory for Genetic Improvement of Crop, Animal and Poultry of Shandong Province, Jinan 250100, China; 2. Jinan Railroad Technical College, Jinan 250013, China)

Abstract: This article introduces the importance of high-oleate peanut research, as well as the basic characteristic, structural characteristics, classification of Δ^{12} -oleic acid desaturase, the molecular basis of the enzyme which result in high-oleate peanut traits, and its biological characteristics.

Key words high-oleate Δ^{12} -oleic acid desaturase monounsaturated fatty acid polyunsaturated fatty acid

中图分类号: S562

文献标识码 A

文章编号: 1002-6630(2008)05-0489-04

花生油酸/亚油酸(O/L)比值是国际贸易中最重要的品质性状指标之一(另一个是黄曲霉毒素污染指标)。目前限制我国花生及其油制品与世界接轨的关键因素之一是其脂肪酸中O/L比值太低。虽然花生亚油酸对软化心脑血管有积极意义, 但因其双键不饱和, 极易氧化酸败而衍生出醛类、酮类及其他产生恶臭味的烃类等, 因而其营养价值次于油酸。因此, 研究培育高油酸花生对开展花生优质育种, 增强在国际贸易中的竞争力具有重要的现实意义。

1 高油酸花生研究的重要性

长期摄入富含大量饱和脂肪酸(saturated fatty acid, SFAD)的动物脂肪会导致高血压、冠心病、动脉粥样硬化等疾病, 而多数植物油中含有大量的多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acid, PUFAD), 其酰基易受氧化, 不但缩短了保存期, 还增加了烹饪过程中的不稳定性;

形成的氧化产物, 往往产生难闻气味和不适口感并伴随着酸败变质, 同时可能会引起动脉硬化^[1]。因此油类中多不饱和脂肪酸的含量、组成及其状态是油类品质最重要的决定因素^[2]。食用含有高单不饱和脂肪酸(monounsaturated fatty acid, MUFA)的油类能够有效的降低胆固醇水平, 而没有油脂氧化的副作用^[1]。降低了多不饱和性意味着油类在组成上与橄榄油更相似, 与普通花生品种相比, 保鲜更久, 在酸败前有了更长的货架期, 因此具有重要的商业价值^[3]。最近一项研究表明, 高油酸花生的低脂肪高单不饱和脂肪酸饮食比严格的低脂肪饮食更能有效的改善血清油脂和载脂蛋白谱(profile)。此外, 高油酸花生产品还能够改善味道, 增加氧化稳定性^[1]。

2 Δ^{12} -FAD的基本特性

Δ^{12} -FAD是膜结合蛋白, 常规的生物化学方法很

收稿日期: 2007-04-05

基金项目: 山东省农业良种工程项目(2003-3001-02); 山东省优秀中青年奖励基金项目(2006BS06024)

作者简介: 张小茜(1981-), 女, 助教, 硕士, 研究方向为植物分子生物学。E-mail: zhangxiaqian198@163.com

*通讯作者: 毕玉平(1961-), 男, 研究员, 博士, 研究方向为植物遗传育种。E-mail: yuping_bi@hotmail.com

难分离纯化膜结合的FAD，因此研究其在自然环境中的生化特性比较困难^[3]。 Δ^{12} -FAD基因开放读码框(ORF)为1140bp，编码379个氨基酸，它包含一个内含子，位于编码区3'末端^[4]。 Δ^{12} -FAD酶促的生化反应在脂肪酸碳链上引入第二个双键，催化油酸(18:1 n-9)转化为亚油酸(18:2 n-6)，是生成亚油酸的关键酶，也是PUFAs代谢n-3和n-6途径的限速酶^[5]。 Δ^{12} -FAD只存在于植物和微生物中，在人和哺乳动物中不存在，所以人体不能自身合成亚油酸。人们先后从蓝细菌(*Synechocystis* PCC6803)、拟南芥^[6]、花生^[1]及棉花^[7]中分离了质体或微粒体 Δ^{12} -FAD基因。编码的蛋白 Δ^{12} -FAD中存在3个组氨酸保守区、2个膜嵌合区、4个保守结构域和15个保守的氨基酸。1998年，Panpoom等将蓝细菌PCC6803的 Δ^{12} -FAD基因在大肠杆菌中进行了表达，表达的 Δ^{12} -FAD占细胞总蛋白的10%，膜总蛋白的25%，且具有生物活性，为研究膜结合蛋白提供了一个过渡表达系统^[8]。

3 Δ^{12} -FAD的结构特性及基因分类

3.1 Δ^{12} -FAD的结构特性

各种膜结合的FAD蛋白序列结构有许多共同特点：氨基端和羧基端同源性很低，但中部序列相对保守，都有2段长的疏水区和2段短的疏水区，形成4个跨膜区和2个膜嵌合区，并且具有3个极其保守的富含组氨酸结构域^[9]。在花生FAD2克隆预测的产物中确定了在所有膜结合脱氢酶中都高度保守的3个富含组氨酸基序[HX_(3±4)HX_(7±41)HX_(2±3)HHX_(61±189)(H/Q)X_(2±3)-HH]^[1]。第一个组氨酸簇前有一个大约40~55个氨基酸残基组成的跨膜区和另一个大约50个氨基酸残基组成的跨膜区，这2个跨膜区可在蛋白质疏水区穿膜4次^[10]。第一和第二个组氨酸簇之间的距离具有高度的保守性，其长度为31个氨基酸，包含一个膜镶嵌蛋白区^[9]。与来自*Synechococcus*的亚油酸脱氢酶、环氧化酶及来自Crepis的乙酰基酶相同，它们都是油脂修饰酶，在第二个组氨酸区SHRXHHS后第九个氨基酸处呈现保守的天冬氨酸，它们在这个酶家族中总是保守的^[2]。第二个组氨酸区之后是第二个膜镶嵌蛋白区，它对底物的识别具有链长特异性和位置特异性，在某些高等植物中还具有组织特异性。3个组氨酸保守区都位于细胞质一侧。其作用是作为金属螯合配基，与二价铁离子结合，在反应中心结合氧，构成FAD催化的活性中心(图1)^[11]。研究表明，FAD2(内质网定位的 Δ^{12} -FAD)C-末端有一个含芳香族氨基酸的序列(-YNNKL)，该保守基序是使其定位到内质网膜上必需和充分的，并且是维持酶活性的必需基序。FAD2 C-末端序列特异的保守基序一般含有 Φ -X-X-K/R/D/ Φ -E- Φ -COOH，其中， Φ 代表大分子疏水氨基酸

残基^[12]。

图1 膜结合FAD的拓扑结构模式图^[13]

Fig.1 Model of proposed topology of membrane-bound FAD^[13]

3.2 花生 Δ^{12} -FAD的基因组成

花生中含有两个微粒体 Δ^{12} -FAD基因(*AhFAD2A*和*AhFAD2B*)，它们是起源于两个不同二倍体种的同源非等位基因，*ahFAD2A*氨基酸序列与大豆*ahFAD2-1*具有82%的同一性，与大豆*ahFAD2-2*具有74%同一性，与拟南芥*ahFAD2*有70%相似性(图2)^[1]。*ahFAD2A*和*ahFAD2B*序列相似，序列分析揭示了二者读码框序列之间存在限制性酶切位点的多态性(*RsaI*位点)^[14]，它们在ORF区表现出99%的同一性，只有11个碱基不同，编码的四个氨基酸发生变化。两个cDNA克隆中侧接甲硫氨酸起始密码子的序列是高度保守的，与公认的植物转录起始统一序列(AACAATGGC)相比只有一个碱基不同(AACAATGGG)^[1]。此外，*ahFAD2A*包含两种不同的等位基因，这两种*ahFAD2A*等位基因中的一个(*ahFAD2A-2*)产生功能性的酶，另一个(*ahFAD2A-1*)产生活性低得多的酶。*ahFAD2A-1*在接近保守组氨酸区域(HX₂HH)有一个残基的突变(D150N)，该区域对酶的功能是至关重要的^[14]。

4 促成高油酸花生表型的分子基础

FAD2很可能是造成高油酸突变的候选基因，因为已知在非光合作用组织，如根和油料作物发育中的种子内，它的翻译产物负责将油酸转化为亚油酸。早先有人分析了发育中花生种子微粒体内FAD2的体外活性。结果表明在高油酸种子中FAD2的活性低的多，而油酸脱氢为亚油酸所需辅助的成分，如溶血磷脂酰胆碱(lyso-PC)：酰基-CoA酰基转移酶，细胞色素b₅还原酶和细胞色素b₅，它们的浓度和活性却几乎没有变化。其他含油种子作物，如向日葵、大豆和油菜籽中高油酸突变体发育中的种子内微粒体FAD2活性都已丧失。这些结果说明微粒体FAD2是控制含油种子内油酸含量的主要酶^[1]。

花生中存在两个FAD2同源基因，因此能够假设：其中一个基因可能通过长期传代被选择出来，成为唯一表达的基因，控制花生油酸水平；也可能，在花生中

相应的增加造成的。在一定条件下, mRNA 水平不受温度影响。能够改变它的最重要的因素可能是启动子活性。但是, 增加的 Δ^{12} -FAD 活性是由寒冷对 mRNA 或蛋白水平的影响造成的, 还是 Δ^{12} -FAD 更长的半衰期直接影响了蛋白的活性? 对此, 学术界有着不同的观点^[22]。因此, FAD2A、FAD2B 这两个同功酶基因是控制油酸含量的关键酶基因, 但可能其他酶基因或多种调控机制也起着重要作用。

6 结论

综上所述, Δ^{12} -FAD 的研究取得了相当进展。但不可否认的是, 还有许多工作亟待解决, 目前我们对 Δ^{12} -FAD 的调节机制还不十分明确, 尤其是在高等植物领域。另一方面, 在我国, 植物基因工程在花生品种改良上的应用研究起步较晚, 这些因素都限制了 Δ^{12} -FAD 遗传操作及其在种质改良方面的进一步应用。

虽然有许多问题尚待研究和解决, 随着花生大量功能基因的分离克隆、表达调控方式和分子机制的阐明, 以及分子水平遗传改良手段的不断完善, 突破花生育种瓶颈也不再是遥不可及。从功能基因的分离入手, 结合研究其表达调控、基因间互作, 揭示性状形成的遗传基础和分子机制, 最终为高油酸花生分子改良育种提供新理论和新方法, 可极大促进我国花生生物技术的长足发展。

参考文献:

- [1] JUNG S, SWIFT D, SENGOKU E, et al. The high oleate trait in the cultivated peanut (*Arachis hypogaea* L.): isolation and characterization of two genes encoding microsomal oleoyl-PC desaturases[J]. Mol Gen Genet, 2000a: 263; 796-805.
- [2] ANN C B, SOOK J, ALBERT G A, et al. The naturally occurring high oleate oil character in some peanut varieties results from reduced oleoyl-PC desaturase activity from mutation of aspartate 150 to asparagines[J]. Crop Sci, 2001: 41: 522-526.
- [3] GUO Q T, WILLIAM P N, CAROL H G, et al. Oleate desaturase enzymes of soybean: evidence of regulation through differential stability and phosphorylation[J]. The Plant Journal, 2005, 44: 433-446.
- [4] LÓPEZ Y, NADAF H L, SMITH O D, et al. Isolation and characterization of the Δ^{12} -fatty acid desaturase in peanut (*Arachis hypogaea* L.) and search for polymorphisms for the high oleate trait in Spanish market-type lines[J]. Theor Appl Genet, 2000, 101: 1131-1138.
- [5] SEIKI T, EIJI S, AKIKO T, et al. Improvement of the fatty acid composition of an oil-producing filamentous fungus, *Mortierella alpina* S-4, through RNA interference with Δ^{12} -desaturase gene expression[J]. Appl Environ Microbiol, 2005, 71 (9): 5124-5128.
- [6] IBA K, GIBSON S, NISHIUCHI T, et al. A gene encoding a chloroplast omega-3 fatty acid desaturase complements alterations in fatty acid desaturation and chloroplast copy number of the FAD7 mutant of *Arabidopsis thaliana*[J]. J Biol Chem, 1993, 268(32): 24099-24105.
- [7] LIU Q, BRUBAKER C L, GREEN A G, et al. Evolution of the FAD2-1 fatty acid desaturase 5' UTR intron and the molecular systematics of *Gossypium* (*Malvaceae*) [J]. Am J Bot, 2001, 88(1): 92-102.
- [8] PANPOOM S, LOS D A, MURATA N. Biochemical characterization of a Δ^{12} acyl-lipid desaturase after overexpression of the enzyme in *Escherichia coli*[J]. Biochim Biophys Acta, 1998, 1390(3): 323-332.
- [9] SHANKLIN J, CAHOON E B. Desaturation and related modifications of fatty acids[J]. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol, 1998, 49: 611-641.
- [10] 元冬娟, 江黎明. 海洋微藻脂肪酸去饱和酶[J]. 生命的化学, 2006, 26(5): 422-425.
- [11] GUILLERMO A P, SILVIA G A, ANTONIO D U. Trypanosoma brucei oleate desaturase may use a cytochrome b5-like domain in another desaturase as an electron donor[J]. Eur J Biochem, 2004: 271; 1079-1086.
- [12] ANDREW W M, JONH M D, PREETINDER K D, et al. Membrane-bound fatty acid desaturases are inserted co-translationally into the ER and contain different ER retrieval motifs at their carboxy termini[J]. The Plant Journal, 2004, 37: 156-173.
- [13] JOHN M D, DORSELYN C C, JUI-CHANG W K, et al. Molecular analysis of a bifunctional fatty acid conjugase/desaturase from tung. Implications for the evolution of plant fatty acid diversity[J]. Plant Physiology, 2002: 130; 2027-2038.
- [14] JUNG S, TATE P L, HORN R, et al. The phylogenetic relationship of possible progenitors of the cultivated peanut [J]. Journal of Heredity, 2003, 94(4): 334-340.
- [15] JUNG S, POWELL G, MOORE K, et al. The high oleate trait in the cultivated peanut (*Arachis hypogaea* L.) II: molecular basis and genetics of the trait[J]. Mol Gen Genet, 2000b: 263: 806-811.
- [16] PATEL M, JUNG S, MOORE K, et al. High-oleate peanut mutants result from a MITE insertion into the FAD2 gene[J]. Theor Appl Genet, 2004, 108 (8): 1492-1502.
- [17] PATRICK S C, DARWIN W R. Functional expression of the extraplastidial arabidopsis thaliana oleate desaturase gene (FAD2) in *Saccharomyces cerevisiae*[J]. Plant Physiol, 1996, 111: 223-226.
- [18] SUSUMU K, ATSUYA S, TOSHIO F, et al. Polyunsaturated fatty acid biosynthesis in *Saccharomyces cerevisiae*: expression of ethanol tolerance and the FAD2 gene from *Arabidopsis thaliana*[J]. Applied and Environmental Microbiology, 1996, 62: 4309-4313.
- [19] KOSHIROU S, KEN-ICHI H, NAOKI F, et al. Two low-temperature-inducible chlorella genes for Δ^{12} and ω -3 fatty acid desaturase (FAD): isolation of Δ^{12} and ω -3 fad cDNA clones, expression of Δ^{12} fad in *Saccharomyces cerevisiae*, and expression of ω -3 fad in *Nicotiana tabacum*[J]. Biosci Biotechnol Biochem, 2002, 66(6): 1314-1327.
- [20] KYOKO W, TAKAHIRO O, HIROMICHI S, et al. Yeast Δ^{12} fatty acid desaturase: gene cloning, expression, and function[J]. Biosci Biotechnol Biochem, 2004, 68(3): 721-727.
- [21] 王敬乔, 陈薇, 曾黎琼, 等. Δ^{12} -脂肪酸去饱和酶基因(FAD2)突变对油菜叶片表面结构和透性的影响[J]. 植物生理与分子生物学学报, 2003, 29(3): 192-198.
- [22] LI M C, LI H, WEI D S, et al. Cloning and molecular characterization of Δ^{12} -fatty acid desaturase gene from *Mortierella isabellina*[J]. World J Gastroenterol, 2006, 12(21): 3373-3379.